

## بیمار عزیز :

این آزمون امکان معاینه مجاری تنفسی شما را توسط یک وسیله کوچک و باریک به نام برونکوسکوپ فراهم می سازد . پزشک شما می تواند هر گونه تنگی و یا اختلال موجود در مجاری تنفسی شما را توسط دوربینی که به انتهای وسیله نصب شده است ، مشاهده نماید . همچنین توسط این وسیله پزشک می تواند از بافت مجاری تنفسی شما نمونه برداری کند و یا اجسام خارجی و یا ترشحات مجاری تنفسی را خارج سازد .




## قبل از آزمون :

- از ۸ ساعت قبل از آزمون از خوردن و آشامیدن خودداری کنید . از تقریباً ۲۴ ساعت قبل از آزمون از نوشیدنی های حاوی الکل استفاده نکنید .
- دندان های مصنوعی ، لنزهای تماسی و جواهرات خود را خارج کنید .
- بلافاصله قبل از آزمون برای بی حسی گلو و توقف رفلکس اوق زدن بی حس کننده موضعی داده میشود . این کار به پیشرفت برونکوسکوپ به داخل تراشه شما کمک خواهد کرد
- قبل از انجام آزمون علائم حیاتی شما کنترل خواهد شد .
- در بسیاری از موارد با تزریق داروی خواب آور و آرام بخش برونکوسکوپی انجام می شود .

## حین انجام آزمون :

- این آزمون ۱۵-۱۰ دقیقه به طول می انجامد . شما در وضعیت خوابیده به پشت

بعد از تاثیر داروهای بی حسی ، برونکوسکوپ از طریق بینی و یا دهان به داخل مجاری تنفسی شما هدایت خواهد شد . توام با جلو راندن برونکوسکوپ مقدار کمی داروی بی حس کننده به منظور کاهش سرفه و تحریک راه های تنفسی به داخل مجاری تنفسی اسپری می شود . در خاتمه کار ، زمانی که پزشک معاینه دستگاه تنفسی را تکمیل کرد برونکوسکوپ را خارج خواهند ساخت .



## پس از آزمون :

برای کنترل اینکه شما احساس راحتی کنید ، مراقب بهداشتی زیر سر شما را بالا می برد . یک تا دو ساعت بعد از آزمون وضعیت شما به دقت کنترل خواهد شد . تا زمانی که اثر بی حسی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی قزوین

مرکز آموزشی درمانی ولایت

برونکوسکوپی



دفتر پرستاری

واحد آموزش

راهنمای آموزش بیماران

با آرزوی سلامتی و بهبودی

- برطرف نشده است از خوردن و آشامیدن یا مصرف داروهای خوراکی اجتناب کنید.
- گاهی ممکن است به طور موقت دچار گرفتگی صدا یا گلو درد شوید . برای رفع این مشکل بعد از بازگشت رفلکس حس گلو ، برای شما مسکن تجویز میشود .
- گاهی بعد از آزمون یک عکس قفسه سینه از شما گرفته خواهد شد .
- ممکن است بعد از آزمون تا چند ساعت خلط خونی داشته باشید . اگر خلط خونی زیاد شد به مراقب بهداشتی اطلاع دهید.
- به مدت ۶-۸ ساعت بعد از آزمون از استعمال دخانیات خودداری کنید .
- در صورت بروز تنگی نفس ، خس خس و درد قفسه سینه فوراً به مراقب بهداشتی خود اطلاع دهید .